

Болезнь Ньюкасла (НБ)

Болезнь Ньюкасла (НБ) — особо опасное высококонтагиозное вирусное заболевание птиц, также известное как вертячка, псевдочума, азиатская птичья чума, пневмоэнцефалит. К заболеванию восприимчивы все домашние и дикие птицы отряда куриных (куры, индейки, цесарки, фазаны, павлины и др.). Степень восприимчивости птицы разных пород и возрастов не одинакова. Более восприимчива молодая птица. Наблюдаются случаи вспышек псевдочумы у цыплят при отсутствии заболевания взрослой птицы, находящейся в контакте с молодняком. Утки и гуси устойчивы к заболеванию, но могут переносить инфекцию латентно и быть вирусоносителями. Характерна быстрая скорость распространения. Признаки появляются по всему стаду в течение 2–12 дней после заражения птицы. Инфекция передаётся не только через прямой контакт с заболевшими особями, но и через их выделения, а также через загрязнённые корма, инвентарь, подстилку, воду, яйца, перо и пух. Резервуарами являются перелетные птицы и насекомые. Вирус способен сохраняться в окружающей среде, что усложняет контроль за его распространением.

Симптомы болезни Ньюкасла:

в лёгких случаях — незначительные респираторные симптомы, такие как кашель и насморк;

более патогенные штаммы могут приводить к серьёзным неврологическим расстройствам, включая паралич и судороги конечностей, скручивание шеи, диарея с водянистым зеленоватым пометом;

инфицированные птицы могут демонстрировать угнетённое состояние, потерю аппетита и снижение яйценоскости и качества яиц.

Профилактика и лечение болезни Ньюкасла:

Вакцинация — существуют различные вакцины против вируса Ньюкасла, которые могут применяться в зависимости от возраста и состояния здоровья птиц. Вакцинация должна проводиться регулярно, особенно в условиях, где существует высокий риск заражения.

Соблюдение санитарных мер — регулярная дезинфекция помещений, в которых содержатся птицы, контроль за качеством корма и воды, минимизация контактов с дикими птицами, которые могут быть переносчиками вируса.

Ограничение доступа к птицам посторонних людей — это поможет снизить риск заноса вируса в хозяйство.

При выявлении заболевших особей необходимо изолировать их от здоровых птиц и обратиться к ветеринару для назначения лечения.

Специфического противовирусного лечения для болезни Ньюкасла не существует.